





Tør vi ta i bruk generative KI-løsninger i legemiddelinformasjonsarbeidet?


Bente By Jansen
13. november 2025



Kunnskapschat med Retrieval Augmented Generation (RAG)




Feil legemiddel!




Er arytmí en bivirkning av **Apexelsin**?

Arytmí kan være en bivirkning av **Apresolin**, som er et legemiddel som kan føre til hurtigere eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner eller takykardi). Disse symptomene kan forekomme tidlig i behandlingen og ved hurtig økning av dosen, men er vanligvis forbigående ved fortsatt behandling.



Kilde: Felleskatalogen - **Apresolin**


Fiktivt legemiddel og fiktiv kildehenvisning!




Hva er indikasjonen for **Seterzin**?

Seterzin er et legemiddel som tilhører gruppen selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI). Det brukes primært for behandling av depresjon og tvangslidelser ved å hemme reopptaket av serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

Kilde: Felleskatalogen - **SSRI**



Feil dosering!




Hva er doseringen av **adalimumab** ved **psoriasis**?


Ved plakkpsoriasis hos voksne er anbefalt dosering av adalimumab 80 mg ved uke 0 og 40 mg ved uke 1, deretter 40 mg hver 2. uke som vedlikeholdsbehandling.

Ved behov for raskere behandlingsrespons kan alternativ induksjonsdosering benyttes: 160 mg ved uke 0, etterfulgt av 80 mg ved uke 2. Risikoen for bivirkninger er høyere ved sistnevnte dose.

Kilde: Felleskatalogen – Amgevita «Amgen»



Feil dosering!



Hva er doseringen av **adalimumab** ved **psoriasis**?


Crohns sykdom

Voksne: 80 mg ved uke 0 og 40 mg ved uke 2. Ved behov for raskere behandlingsrespons: 160 mg ved uke 0 (gitt som 4 injeksjoner à 40 mg i løpet av 1 dag eller 2 injeksjoner à 40 mg pr. dag i 2 påfølgende dager), etterfulgt av 80 mg ved uke 2 (gitt som 2 injeksjoner à 40 mg på 1 dag). Risikoen for bivirkninger er høyere under induksjonen. Anbefalt dose etter induksjonsbehandling er 40 mg hver 2. uke. Under vedlikeholdsbehandling kan kortikosteroider seponeres gradvis iht. kliniske retningslinjer. Enkelte pasienter som opplever redusert respons kan ha nytte av en økning i dosering til 40 mg hver uke eller 80 mg hver 2. uke. Enkelte pasienter som ikke responderer innen uke 4 kan ha nytte av fortsatt behandling t.o.m. uke 12. Fortsettelse av behandling bør overveies nøye hos pasienter som ikke responderer i løpet av denne tiden.

mg ved uke 2. Risikoen for bivirkninger er høyere ved sistnevnte dose.

Kilde: Felleskatalogen – Amgevita «Amgen»

Feil dosering!




Hvor mange mikrogram Evrysdi skal gis til et spedbarn på 6 uker med vekt 3600g?


For et spedbarn på 6 uker med vekt 3600 g (3,6 kg) er anbefalt daglig dose av Evrysdi **0,2 mg/kg**, som tilsvarer 720 mikrogram (0,72 mg) eller 0,96 ml av miksturen (0,75 mg/ml).

Doseringen av Evrysdi til spedbarn under 2 måneder er **0,2 mg/kg** én gang daglig. Felleskatalogen angir at dosen avhenger av alder og kroppsvekt, og for premature spedbarn baseres doseringen på korrigert alder.

Kilde: Felleskatalogen – Evrysdi «Roche»



Feil dosering!



Hvor mange mikrogram Evrysdi skal gis til et spedbarn på 6 uker med vekt 3600g?

Pulver til mikstur

Dose avhenger av alder og kroppsvekt, se tabell.

Alder ¹ og kroppsvekt	Anbefalt daglig dose
<2 måneder	0,15 mg/kg
2 måneder-<2 år	0,2 mg/kg
≥2 år (<20 kg)	0,25 mg/kg
≥2 år (≥20 kg)	5 mg

¹Basert på korrigert alder for premature spedbarn.

kroppsvekt, og for premature spedbarn baseres doseringen på korrigert alder.


Kilde: Felleskatalogen – Evrysdi «Roche»



Når blir en medisinsk
kunnskapschat et
medisinsk utstyr?




Hvilke krav vil komme i
KI-forordningen?



Ansvar?

Advarsel: Dette innholdet er generert ved hjelp av kunstig intelligens. Selv om det bygger på pålitelige kilder, kan det inneholde feil eller mangler. Kontroller alltid opplysningene før faglig bruk.




*Det er ekstra problematisk at et velrenommert
«brand» som Felleskatalogen brukes da brukere
vil ha større tendens til å stole på svarene de får.*

Damoun Nassehi,
Førsteamanuensis ved Fagområdet for allmennmedisin,
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB

KI-assistert søk for Felleskatalogen?





FELLESKATALOGEN